



ПОДГОТОВКА К ЛЕЧЕНИЮ
РАДИОЙОДОТЕРАПИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РАКА
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Обязательным условием эффективного проведения лечения радиоактивным йодом является:

- ✓ отмена за месяц до процедуры лекарственных препаратов, содержащих в себе йод (L-тироксин, Эутирокс, сердечные препараты, отхаркивающие препараты, витамины, добавки, растворы, содержащие йод);
- ✓ исключение продуктов питания, содержащих в себе йод (приложение 1);
- ✓ исключение проведения рентгенологических (рентгенография, КТ, МРТ) исследований связанных с введением йодсодержащих контрастных препаратов.

Процедура:

- ✓ Радиойодтерапия представляет собой одномоментный прием радиоактивного йода внутрь в виде жидкости, без цвета, вкуса и запаха.
- ✓ Проводится радиойодтерапия в специализированном стационаре с палатами, оборудованными системой вентиляции воздуха и канализационными стоками для дезактивации радиоактивных отходов.
- ✓ На 3-4 день после приема лечебной активности радиоактивного йода пациенту проводится сцинтиграфия всего тела, которая при необходимости может быть дополнена ОФЭКТ-КТ, для оценки накопления изотопа в теле пациента.