

**ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»**

Радиологический центр

г. Тюмень, ул. Ю. Семовских, 12

+ 7 (3452) 270-635, 520-301



**ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ**

**ЛЕЧЕНИЕ ДИФФУЗНО-ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА**

- ✓ Отмена приема тиреостатических препаратов (Тирозол, Мерказолил) за 3-10 дней до радиойодтерапии.
- ✓ Отмена приема синтетических аналогов гормонов щитовидной железы (Эутирокс, L-тироксин) за 4 недели до радиойодтерапии;
- ✓ Трийодтиронин отменяется за 2 недели до радиойодтерапии.
- ✓ За 4 недели до радиойодтерапии надлежит прекратить прием других лекарственных препаратов, содержащих в своем составе йод (отхаркивающие средства, витамины, пищевые добавки и т.д. – за 2-4 недели до лечения; амиодарон/кордарон, бетадин, р-р Люголя, рентгенконтрастные вещества – за 1-6 месяцев до лечения).
- ✓ Также, за 4 недели до лечения необходимо соблюдать пищевую диету с низким содержанием йода.

Регистратура: + 7 (3452) 270-635, 520-301

<https://lp.medgorod.info/>