



## **ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ**

### **РАДИОЙОДОТЕРАПИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

**Обязательным условием эффективного проведения лечения радиоактивным йодом является:**

- ✓ отмена за месяц до процедуры лекарственных препаратов, содержащих в себе йод (L-тироксин, Эутирокс, сердечные препараты, отхаркивающие препараты, витамины, добавки, растворы, содержащие йод);
- ✓ исключение продуктов питания, содержащих в себе йод (приложение 1);
- ✓ исключение проведения рентгенологических (рентгенография, КТ, МРТ) исследований связанных с введением йодсодержащих контрастных препаратов.

**Процедура:**

- ✓ Радиойодтерапия представляет собой одномоментный прием радиоактивного йода внутрь в виде жидкости, без цвета, вкуса и запаха.
- ✓ Проводится радиойодтерапия в специализированном стационаре с палатами, оборудованными системой вентиляции воздуха и канализационными стоками для дезактивации радиоактивных отходов.
- ✓ На 3-4 день после приема лечебной активности радиоактивного йода пациенту проводится сцинтиграфия всего тела, которая при необходимости может быть дополнена ОФЭКТ-КТ, для оценки накопления изотопа в теле пациента.

Регистратура: + 7 (3452) 270-635, 520-301

<https://lp.medgorod.info/>