



**ПОДГОТОВКА К  
СЦИНТИГРАФИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
с  $^{99m}\text{Tc}$ -Пертехнетатом**

- ✓ Специальная подготовка: за две недели до предполагаемого исследования необходимо прекратить прием препаратов, влияющих на функцию щитовидной железы: L-тироксин, эутирокс, мерказолил, пропицил, тирозол и др. Также необходимо придерживаться диеты с низким содержанием йода и исключить все контакты с йодсодержащими веществами.
- ✓ При себе иметь медицинскую документацию (направление на исследование, результаты УЗИ щитовидной железы, результаты пункционной биопсии узловых образований щитовидной железы и анализов крови на гормоны (ТТГ, Т4 свободного, Т3 свободного, АТ к рецепторам ТТГ), если выполнялись.
- ✓ Радиофармацевтический препарат:  $^{99m}\text{Tc}$ -Пертехнетат.

**Проведение обследования:**

- ✓ Введение радиоактивного препарата производится внутривенно. Через 15-20 минут после введения РФП выполняется сцинтиграфия в трех проекциях, в положении пациента лежа на спине с запрокинутой назад головой.
- ✓ Результаты обследования будут готовы в течение суток.