



ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ СЦИНТИГРАФИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ с ^{99m}Tc -Пертехнетатом

- За две недели до предполагаемого исследования необходимо прекратить прием препаратов, влияющих на функцию щитовидной железы - L-тироксин, эутирокс, мерказолил, пропицил, тирозол. Также необходимо придерживаться диеты с низким содержанием йода и исключить все контакты с йодсодержащими веществами.
- При себе иметь результаты УЗИ щитовидной железы, результаты пункционной биопсии узловых образований щитовидной железы (если выполнялась) и анализов крови на гормоны (ТТГ, Т4 свободного, Т3 свободного, АТ к рецепторам ТТГ).
- Используемый препарат: ^{99m}Tc -Пертехнетат.
- Способ выполнения исследования. Пациенту внутривенно вводится препарат ^{99m}Tc - Пертехнетат. Исследование проводится через 15-20 минут после введения радиофармпрепарата (РФП) в передней проекции, в положении лежа на спине с запрокинутой назад головой с валиком под шейю.
- Время исследования. Общее время выполнения диагностической процедуры, с момента введения радиофармпрепарата до получения окончательных изображений, составляет примерно 40-50 минут. Время обработки результатов - около 40 минут и зависит от конкретной клинической ситуации.